



Jännittelämännän purkajana
Yksinomaan kertakäyttöinen

TPAK **TPAK10** 14 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-541-0635  TM-303
10 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-673-1701  TM-310

 TyTek Medical Inc.
8904 Beckert Rd, West Chester, OH 45069, US
www.tytekmedical.com

Ohjeet koulutetuille hoitohenkilöstölle

• TPAK/TPAK10 on steriili laite, joka on tarkoitettu asennettavaksi keuhon sisään helpottamaan ilman tyhjenytystä keuhkopuussa kaasusuonikkeen läsnä oloa.

• Valitse asennettavan neulan/kateeterin sijainti esimällä seuraavasti:

- Tonien interkostaalinen tila eturinnassa keskilokalisoinnilla tietyllä samalla puolella kehoa kuin vamma.
- Neljäs interkostaalinen tila eturinnassa aksillaalisella samalla puolella kehoa kuin vamma.
- Puhdistaa neulan pistokohdan antiseptisellä liuoksella.

- Varmista, että turvavälineet on ehjät. Jos se ei ole ehjä, älä käytä sarjaa. Turtu JIP53ään (Tension Pneumothorax Access Kit, TPAK) lujalla otteella, riko nämä välineet ja nauti puhtaita kaasusuonikkeen ja pöytä JIP53:n neula/kateeteri kokonana.
- Poista JIP53:n neula/kateeteri kokonana.
- Aseta neula-/kateeteriportaan porttaan välttämään portkaan polttamista ihossa heti kylkilyn jälkeen vuorokauden välein kylkilyn alkamisella. Ohjaa neula/kateeteri interkostaaliseen tilaan 90 asteen kulmassa rintakeuhon suhteen.
- Jos käytät keskilokalisoinnilla linjaa, varmista, että neulan seinämenetkoko riittää sille ennen kuin lineaari suhteutetaan linjan eikä suuntaudu sydäntä kohti.
- Jos käytät eturinnassa aksillaarista linjaa, varmista, että neulan sisäänmenokohda ei ole nännin alapuolella.
- Kun neula/kateeteri on asennettu oikein keuhkopuustontontoon, kulet ilman poistuvan äkkilähti jännittelämännän puolesta kaasusuonin kanssa. Pidä neula paikallaan 5–10 sekunnin ajan.
- Irrota neula, mutta jätä kateeteri paikalleen. Kirjoita se koulutusasi mukaisella työllä.
- Seuraa potilasta tarkasti siinä varalta, että jännittelämätta uusistuu tai hänelle tulee hengitysvaikeuksia.
- Huomaajia: Käsitä lähteesien liittyvistä vakavista vaarantilaisista on ilmoitettava välittömästi tieteelliseen viromassalle alueelle, jossa käyttäjä potilaan sijaitsee.

Ruumiinesteiden eristystyökalut

Käytä aina asianmukaisia ruumiinesteiden eristysvälineitä ja henkilökohtaisia suojaavusteita, jotta pyyrit estämään kosketuksen saasteisnain nesteisiin.

Huomio

JIP5 (jännittelämännän purkaja) -sarjaa saavot käyttöä niin työkäyttöä, että sen saameet asennusohjeiden mukaan jännittelämännän levitysohjeissa. JIP5:n virheellinen käyttö voi aiheuttaa vammaa. Käytä JIP5:ää pelustuvainvaimonesta tai lääkärin ohjeiden mukaan.

Neulan tekniikka on vaikeaa ottaa sydämen taakse ja sydämen taakse on vaarallista hengenvaarallisen verenvuodon keuhkoödemien, aortan tai interkostaalisen verisuonen vaurioitumisen, hyödynyt pistos ja mahdollinen (potentiaal) hermovaurio pistokohdassa. Vaarat voidaan välttää noudattamalla hyväksytyjä protokollia, koulutusta ja kolmen pistoketta. Jos niitä ei noudateta, voi aiheutua portkaan dekompensoitumia, vamma ja/tai kuolema.

Hävittäminen

JIP5 on kertakäyttöinen. Sitä ei saa käyttää uudelleen missään olosuhteissa. Turvettu voidaan käyttää kertaa, mutta jälkeen se on hävitettävä asianmukaisesti. Hävitä JIP5:ää stem, että tuhlausriskin alhustetaan ainest en eristetty ja hävitetty ensinistä alhustetun vaimon estetty.


Säilytys

Pidä JIP5 - jännittelämännän purkajaa kuivana. Säilytetään 12–60 °C:ssa.



Rajoitettu takuu

Tämän paketin sisältämät tuotteet ja komponentit ovat lääkinnällisiä laitteita, jotka on tarkoitettu yksinomaan asennus- ja koulutus- ja tutkimus- ja diagnostisiin tarkoituksiin. Tytek Medical Inc. takaa, etteä tuotteet ja komponentit materiaalisia ja työn jäljessä ole vikoja ja että ne soveltuvat vain käyttävätkä lääkinnällisillä laitteissa oppaassa kuvattuihin tarkoituksiin koulutuksen tai tutkimuksen tarkoituksiin. Tämä takuu ei sisällä korjauksia, koulutusta, teknistä tukiä tai muuta palvelua. Tytek Medical Inc. on lahjittanut tuotteita. Tuo tuotteita tai komponenttejä käytetään muuhun kuin tassa oppaassa kuvattuihin tarkoituksiin tai niitä käyttää sellainen henkilö, jota ei ole koulutettu tai jolla ei ole oikeudellisia valtuuksia tuotteiden tai komponenttien käyttöön, tässä rajoitettu takuu mitään. MAJUTION KUN TASÄÄ ASARINASSA MÄÄRITETTY NOSTA TUA KOMPONENTTELE INC. EI ANNA MITÄÄ TAKUUTA TAI TUETTUA TUOTTEITA TAI KOMPONENTTELE SEKÄ SUOJAUTUA IRIT OLETTAUSTA VAIKUTUUSTA MYNNITKELPUOLIKSEEN. SOVELTUVUDESTA TIETTYNY TARKOITUKSEEN.

Tämä tuote myydään ja sitä saa käyttää ainoastaan osoitettuna www.tytekmedical.com annettujen ehtojen mukaisesti.

 TyTek Medical Inc.
8904 Beckert Rd, West Chester, OH 45069, US
www.tytekmedical.com

Zestav dostupný po odmy přezky
Wylęczanie do jednorazowego użycia

TPAK **TPAK10** 14 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-541-0635  TM-303
10 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-673-1701  TM-310

 TyTek Medical Inc.
8904 Beckert Rd, West Chester, OH 45069, US
www.tytekmedical.com

Instrukcie dla przelozekowego personelu medycznego

• TPAK/TPAK10 jest jalowym wyrobem przeznaczonym do wprowadzenia do ciała w celu pomiaru w suwaniu powietrza z jamy opłuczek u pacjentów z odmy przęchna.

• Wybrać lokalizację wprowadzenia igły/cewnika poprzez identyfikację:

- drugiej przestrzeni międzyżebrowej na przedniej stronie klatki piersiowej przy linii środkowej obrotowej (po lewej stronie ciała, po której występuje uraz).

- czwartej przestrzeni międzyżebrowej na przedniej pachowej linii (po samej stronie ciała, po której występuje uraz).

• Użyć antyseptycznego roztworu do oczyszczenia miejsca wkładania igły.

• Sprawdzyć, czy zabieg wykonać jest niemożliwe. Jeśli jest uzasadnione, użyć zamiast używać zestawu. Chociaż można TPAK/TPAK10, przekazać znieczulającą nakłętą, aby zmniejszyć znieczulenie, i usunąć nakłętą.

• Wyjąć igły/cewnik TPAK/TPAK10 z odłożenia.

• Wprowadzić jedynkę przedniej przęchni pacjenta do wybranej lokalizacji w kierunku tylnego kręka zebra, unikając odległego kręka zebra. Skierować igłę w kierunku przestrzeni międzyżebrowej pod kątem 90° do skóry klatki piersiowej.

• W przypadku wykorzystywania linii środkowej obrotowej w lewej stronie, aby wkładanie nie było zbyt wąskie w stronę linii gruczołu szlankowego w kierunku serca.

• W przypadku wykorzystywania linii pachowej upewnić się, że miejsce wkładania igły jest na dole gruczołu szlankowego.

• Kiedy igła/cewnik znajduje się w przestrzeni opłuczek, będzie można uzyskać nałożę uciążliwą powiatkę, ponieważ odma przęchna zostanie poddana dekompresji – przytrzymanie igły w miejscu przez 5–10 sekund.

• Usmięć igła, ale kateeter niechaj pozostanie w miejscu. Zabezpiecz i spróbuj pokazywać na szkoleniu.

• Monitorować pacjenta pod kątem nawrotów odmy przęchny lub niewydolności oddychowej.

• Uważać każde powozne zdarzenie związane z wyborem nałże zygły producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym użytkownicy pacjenta zamieszkuje.

Ostrzeżenie o izolacji substancji organizmu

Zawsze używać odpowiednich procedur izolacji substancji organizmu oraz środków ochrony indywidualnej, aby zapobiec kontaktowi z zanieczyszczonymi płynami

Uwaga

TPAK/TPAK10 – zestaw dostępowy do odmy przęchny powinien być używany jedynie przez personel, który przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu procedur zmniejszenia ciśnienia podczas odmy przęchny. Niewłaściwe użytkowanie TPAK/TPAK10 może spowodować uraz. Używać TPAK/TPAK10 zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami lekarza.

Potencjalne niebezpieczeństwo dekompresji igłowej obejmuje tamponadę serca, krwiawienie zaprzagające zyczu i powodu urazu tkanki pierznej, atery lub naczyń międzyżebrowych, infekcjazne wprowadzenie urazu do tkanki pierznej, krwiawienie do jamy opłuczek. Niebezpieczeństwo można uniknąć poprzez stosowanie się do zaleceń wytycznych protokołów i szkoleń. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do obrażeń ciała, urazu lub śmierci pacjenta.

Użytylizacja

TPAK/TPAK10 przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia. Nie używać ponownie pod żadnym pozorem. Można wykorzystać po jeden raz, a następnie odpowiednio zniszczyć. Złuzylność TPAK/TPAK10 w sposób, który zapewnia izolację substancji organizmu o potencjalnie zakaźnych substancji oraz zapobiega urazom z wykorzystaniem ostrej przęchni.

Przechowywanie

Przechowywać TPAK/TPAK10 – zestaw dostępowy do odmy przęchny w suchym miejscu. Przechowywać w temperaturze od -12°C do 60°C (10°F do 140°F).



Ograniczona gwarancja


Produkt i komponenty zawarte w opakowaniu są wyrobami medycznymi przeznaczonymi do postaci niezbędnych praktycznych zastosowań. Firma Tytek Medical Inc. zapewnia, że produkty i komponenty nie mają wad materiałowych i powstających podczas produkcji oraz że spełniają kryteria wyrobów medycznych. Tytek Medical Inc. nie udziela żaden rodzaj gwarancji w instrukcji przez przekazywanej osobom niebędącym pracownikami. Tytek Medical Inc. nie udziela żadnych gwarancji w instrukcji lub przez osobę nieprzeznaczoną lub nieopisującą prawnie do użytku produktów lub komponentów niezawieszając ograniczoną gwarancję. Z UWYTKIEM PRZEDPODZIAWY OGRANICZENIA WNIOSKÓW TYTEK MEDICAL INC. NE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI. WNIOSKI GWARANCJI W KONTAKTACH LUB DOROCZNYMI KONTAKTAMI DOTYCZĄCYMI PRODUKTÓW LUB KOMPONENTÓW W SZCZEGÓLNOŚCI WYKAZA WYKONANE GWAANCJĄ PRZYDATNOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ HANDLOWEJ PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEJ CELU.

Niniejszy produkt musi być sprzedawany i używany ściśle według warunków zawstanych na stronie www.tytekmedical.com.

 TyTek Medical Inc.

Tenzisno pneumothorax leśzivó kšezlet
Kizárólag egyszer hasznáható

TPAK **TPAK10** 14 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-541-0635  TM-303
10 ga x 3,25 in. NSN: 6515-01-673-1701  TM-310

 TyTek Medical Inc.
8904 Beckert Rd, West Chester, OH 45069, US
www.tytekmedical.com

Haszalálati utasítás kézzelt egészségügyi személyzetnek

• A TPAK/TPAK10 egy steri eszköz, mely a szervezetre való bejuttatására szolgál, hogy megkönnyítse az elvezetést a tenzisno pneumothorax szűrésére szolgáló katéterbe.

• Válassza ki a tü/kateeter behatolás helyét az alábbiak között:

- A második bordaközi tér a mellkas elöló részén, a medioklavikuláris vonalán a test középső axonális oldalán.

- A negyedik bordaközi tér az elöló hányónyalvonal a test sérülését azonos oldalán.

• Használjon antimikrobiális oldatot a tüszűrés helyének tisztításához.

• Ellenőrizze, hogy a biztonságos tapaszás szerelvények a használaton a kšezletet egy erőteljes mozdulattal csavargja el a prosz hatázelőtti kupakot a TPAK/TPAK10 eszközhöz, ellenőrizze a tapaszást, és vegye le a kupakot.

• Vegye ki a TPAK/TPAK10 tü/kateeter a kšezletből.

• Aseta neula-/kateeteriportaan porttaan välttämään portkaan polttamista ihossa heti kylkilyn jälkeen vuorokauden välein kylkilyn alkamisella. Ohjaa neula/kateeteri interkostaaliseen tilaan 90 asteen kulmassa rintakeuhon suhteen.

• Ha kulsccostat középső vonalát használja, ügyeljen arra, hogy a tübemenet a mellkas nem mediális a mellbimbóvalonos felé képezik, és nem a szív felé irányul.

• Ha elöló hányónyalvat használ, ügyeljen arra, hogy a tübemenet pontja ne legyen alsócsontny a mellbimbóval.

• Miután a tü/kateeter a pleurális térben van, hallgat fogja, ahogy a levegő átvezetése etszik, mivel a pneumothorax feszültségének megszűnése – tartja a tü b helyén 5–10 másodperc.

• Húzza ki a tüöt, de a kateeteret hagyja a helyén. Rögzítse a kšezést ahelyre, ahol meghatározott módon.

• Gondoskodjon foglye meg a betegét, hogy nem juttat-e ki a tübemenetből a levegőt a vágás transzmisszió „be helyezés nehezítésé.

• Megjegyzés: Az eszközt kapcsolatos minden súlyosi eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó beteg szájéhelye szerenti illetékes hatóságok.

Testizolációs figyelmeztetés

Mindig használjon megfelelő testizolációs eljárást és egyéni védelészerelést, hogy megakadályozza a szennyezést folyadékokkal való érintkezést.

Figyelmeztetés

TPAK/TPAK10 – szűrőes pneumothorax leśzivó kšezlet kizárólag olyan személyek által használandó, akik megfelelő képzést kaptak a tenzisno pneumothorax kšezésére vonatkozó eljárásokról. A TPAK/TPAK10 helytelen használata veszélyes lehet. Használja a TPAK/TPAK10 eszközt az EMS hatóságokkal vagy egy orvos utasításainak megfelelően.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a ivadási vaszta. To nevroterianava van zavart, paracetamol, kompetingiaf tármaly.

A tüvel végzett dekompreszió lehetséges veszélyei közt tartozik a szívtamponád, az elvezetési vezél és pulmonális artériás aneurys specifikus arteriális szűrés, ideális baloldali aneurysz pleurális artériális, aortas vagy tártsponkalisz kraujaglyakcsúzulás, nyémajom védelem és iszperjúmú nevrus trauma ivadási vaszta. Risks van nevrot, ijevrotot aszpitinatios potokok, apmábók a